

Calendario de la vacuna COVID-19 2024-25 – Calendario Rutinario

Para obtener la versión en línea y los detalles, consulte las [Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas contra el COVID-19](#). El calendario está sujeto a cambios

Edad*	Vacuna	Si no está vacunado:	Si ha tenido alguna dosis previa, dé 2024-25 dosis:
6 meses–4 años [†]	Pfizer– Bebés y niños pequeños		Si 1 dosis previa, entonces: 3-8** semanas ① ≥8 semanas ② Si ≥2 dosis previas, entonces: ≥8 semanas ①
	Moderna– Pediátrico [‡]		Si 1 dosis previa, entonces: 4-8 semanas ① Si ≥2 dosis previas, entonces: ≥8 semanas ①
5 –11 años	Moderna– Pediátrico [‡]	1 Dosis	Si 1 o más dosis anteriores (de cualquiera de las marcas), entonces[^]: ≥2 meses ① 2024-25 Moderna/Pfizer/ Novavax
	Pfizer– Pediátrico	1 Dosis	
12+ años	Pfizer– Adol/Adulto (Comirnaty)	1 Dosis	Si 1 o más dosis anteriores (de cualquiera de las marcas), entonces[^]: 12-64 años: ≥2 meses ① 2024-25 Moderna/Pfizer/ Novavax 65+ años: ≥2 months ① 6 months [§] ②
	Moderna– Adol/Adulto (Spikevax)	1 Dosis	
	Novavax		

* Consulte las [recomendaciones de los CDC](#) para los niños que hacen la transición de una edad menor a una edad mayor

† Los niños de 6 meses a 4 años deben recibir la misma marca de la vacuna actualizada que las dosis anteriores que recibieron.

** Un [intervalo de 8 semanas](#) puede ser preferible para algunas personas, especialmente para los varones de 12 a 39 años..

‡ Todas las dosis de Moderna de 6 meses a 11 años son de 0.25 ml (25 mcg).

^ La vacuna Janssen (J & J) ha sido desautorizada. Siga el calendario para mayores de 12 años para cualquier dosis anterior

§ Intervalo mínimo de 2 meses.

¶ Si han transcurrido más de 8 semanas desde la primera dosis de Novavax, puede administrarse cualquier vacuna COVID-19 2024-25 (Moderna/Pfizer/Novavax).



Calendario de la Vacuna COVID-19 2024-25 **si está moderada o gravemente inmunocomprometido**

Edad	Vacuna	Si no está vacunado:	Si recibió alguna dosis anterior administre 2024-25 dosis:
6 meses–4 años	Pfizer Bebés y niños pequeños		1 dosis previa: 3 s 1 ≥8 s 2 ≥2 dosis previas: ≥8 s 1 6 m^s Dosis Adicional*
	Moderna–Pediátrico		1 dosis previa: 4 s 1 ≥4 s 2 2 dosis previas: ≥4 s 1 6 m^s Dosis Adicional*
5 –11 años	Moderna–Pediátrico		1 dosis previa: 4 s 1 ≥4 s 2 2 dosis previas: ≥4 s 1 ≥3 dosis previas** ≥8 s 1 (mayores de 5 años, la dosis de Pfizer está bien) 6 m^s Dosis Adicional*
	Pfizer–Pediátrico		1 dosis previa: 3 s 1 ≥4 s 2 2 dosis previas: ≥4 s 1 ≥3 dosis previas** ≥8 s 1 6 m^s Dosis Adicional*
12+ años	Pfizer–Adol/Adulto (Comirnaty)		1 dosis previa: 3 s 1 ≥4 s 2 2 dosis previas: ≥4 s 1 ≥3 dosis previas** ≥8 s 1 6 m^s Dosis Adicional*
	Moderna–Adol/Adulto (Spikevax)		1 dosis previa: 4 s 1 ≥4 s 2 2 dosis previas: ≥4 s 1 ≥3 dosis previas** ≥8 s 1 6 m^s Dosis Adicional*
	Novavax		≥1 dosis previas** ≥2 m 1 6 m^s Dosis Adicional*

* Pueden administrarse **dosis adicionales** bajo decisión clínica compartida con un intervalo mínimo de 2 meses. Véa la [Tabla 2](#) para el vial y la dosis

** A los niños de 5 a 11 años se puede administrar Moderna o Pfizer después de ≥3 dosis previas. Los mayores de 12 años pueden recibir Moderna, Pfizer o Novavax.

§ Intervalo mínimo de 2 meses.

¶ Si han transcurrido más de 8 semanas desde la primera dosis de Novavax, puede administrarse cualquier vacuna COVID-19 2024-25 (Moderna/Pfizer/Novavax).

